

Gust plăcut și
răcoritor



Rehydrol[®]

Rehidratare de la mic la mare



Respectă compoziția recomandată de  **ESPGHAN**

Gust plăcut și
răcoritor de



Rehydrol[®]

Rehidratare de la mic la mare

De ce Rehydrol?

Pentru refacerea
rezervelor de :

- Apă
- Electroliți
- Energie

Când este recomandat

- Diaree
- Vărsături
- Stări febrile
- Insolații
- Transpirații
abundente



MBA Pharma
Innovation for patient treatment

Gust plăcut și
răcoritor de



Rehydrol[®]

Avantajele administrării

Recomandat
pentru întreaga
familie

Respectă
compoziția
recomandată
de ESPGHAN

Complianță
excelentă,
atât la copil cât
și la adult



MBA Pharma
Innovation for patient treatment

Gust plăcut și
răcoritor de



Rehydrol[®]


Avantajele administrării

**Pulbere
naturală de
banane**

**Formulă dezvoltată
în Elveția**

**Produs în
Italia**

**Gust plăcut
și răcoritor
de banană**



MBA Pharma
Innovation for patient treatment

Gust plăcut și
răcoritor de



Rehydrol®

Compoziție și mod de administrare

Modul de utilizare:

Conținutul plicului se dizolvă în 200 ml de apă potabilă. Cantitatea de lichid în care se dizolvă conținutul plicului trebuie să fie respectată, pentru a se obține cantitatea optimă de săruri, zahăr și lichid în soluție.

Conținutul preparatului	Conținutul în 100g de preparat	Conținutul unui plic
Glucoză	71,73 g	3,96 g
Clorură de sodiu	6,32 g	0,35 g
Clorură de potasiu	5,38 g	0,30 g
Citronat de sodiu	9,33 g	0,51 g
Pulbere naturală de banană (potențiator de aromă)	7,25 g	0,40 g
Valoarea energetică kJ/kcal	1219,00/291,43	67,32/16,09

Doza recomandată:

Soluția trebuie ingerată treptat, pe o perioadă de cel puțin 4 ore; în cazul copiilor cu vârsta de peste trei ani, soluția se poate consuma treptat, cu lingurița.

< 20 kg: 30- 50 ml/kg corp/4 ore

> 20 kg și adulți: 1 plic la 4 ore



Rehidratare de la mic la mare

